

COTRIMOXAZOLE®
BACTRIM®
BACTRIM FORTE®



Date d'application : 01/04/2012 Version 1

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Sulfamides** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé.
En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.

Comment prendre votre médicament ? A prendre de préférence en début de repas, **et à heure régulière.**



Comprimés :

A prendre par voie orale avec un verre d'eau.



Suspension buvable : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Se rapporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique aux sulfamides**, au **triméthoprime** ou aux **sulfites** des médicaments injectables.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chutes de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin.
Réaction plus importante (fièvre, cloques, ulcères buccaux, rougeur des yeux, malaises généraux, douleurs musculaires et articulaires)		CESSEZ de prendre ce médicament et contactez votre médecin.
Anémie (essoufflement, fatigue, perte d'appétit)		Contactez votre médecin
Diminution du nombre de plaquettes (ecchymoses, saignements inexpliqués du nez ou des gencives, présence de sang dans les urines ou les selles...)		Contactez votre médecin
Diarrhées	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours contactez votre médecin.

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !