



Important : Ce médicament n'étant pas disponible en pharmacie de ville, il est nécessaire de se le procurer à la pharmacie de l'hôpital dès votre sortie du service.

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Oxazolidinones** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. **En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

Comment prendre votre médicament ? A prendre en **début de repas, et à heure régulière.**



Comprimés :

A prendre par voie orale avec un verre d'eau.

Les comprimés **ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués** car cela diminuerait leur efficacité.



Suspension buvable : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Se rapporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise. Une dose de 600 mg est fournie par 30 ml de suspension buvable reconstituée (soit 6 cuillères-mesure de 5 ml).

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique au Linezolid**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Goût métallique dans la bouche	Prenez votre médicament aux repas ou avec une collation.	Contactez votre médecin si ces symptômes persistent.
Diarrhées	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours contactez votre médecin.
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin.
Anémie (essoufflement, fatigue)		Contactez votre médecin.
Fourmillements et baisse de sensibilité des extrémités pour les traitements de durée supérieure à 1 mois		Contactez votre médecin.
Troubles visuels (diminution de l'acuité visuelle, modification de la vision des couleurs, du champ visuel)		Contactez immédiatement votre médecin

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !